

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Güzlük Çeşitler için)

FİDE DÖNEMİ



PROBLEM 1

Aşırı sıcak, ve jetatif gelişim hızlı, kök zayıf, bitki gövdesi ince ise;

DAMLMADAN(1000 m²)YE

RATOON 15.....2,5 KG
+
0-30-40.....2 KG
+
FULLBASS 69.....1 KG

RATOON 15.....2,5 KG
+
FOLKAR-K.....1 LT
+
12-36-122 KG

Not: Bu karışımındaki FOLKAR-K aynı zamanda damar açıcı, izelement taşıyıcı ve kök hastalıklarına karşı bitkinin bağırsızlık sistemini güçlendirici etki yapar.

* Eğer PROBLEM 1'e ek olarak aşırı sulamadan veya toprak yapısından dolayı (aşırı killi) torftan kök atamıyor ise;

Once DAMLMADAN(1000 m²)ye

SULPHUR.....2-3 KG
+
CALVIN.....1-2 LT
+
NOABSES.....1 LT

1 gün RATOON 15.....2,5 KG
sonra ZENITH.....1 LT
+
12-36-122 KG

* Eğer bitki PROBLEM 1'de sıyrılanlar gibi vede normal veya kalın gövdeli ise;

DAMLMADAN(1000 m²)YE

DURAN2,5 LT
+
NOABSES.....1 LT
+
GÜBRE



PROBLEM 2

Bitkinin herhangi bir nedenden dolayı vejetatif gelişimi zayıf (şok, toprak yapısı, sürüm hatası veya yanlış ilaç kullanımı), virüs riski var ise

DAMLMADAN (1000 m²)YE

SULPHUR.....3 KG
+
NOABSES1 LT
+
18-18-18 veya 20-20-202-3 Kg
+
PROFER 6 (DEMİR)100 Gr

2 gün SULPHUR.....3 KG
sonra 20-20-203 Kg
+
ZENITH1 Lt
+
APEX2 Kg

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

a) Şok ve hormonvar ise;

NOABSES200 cc/100 Lt. Suya
+
ZENITH150 cc/100 Lt. Suya

b) Vejetatif gelişim ve virüs riski için

NOABSES150 cc/100 Lt. Suya
+
NİMBUS 52200 Gr/100 Lt. Suya
+
PROMAX COMBİ.....100 GR.

PROBLEM 3

Nemotod olan yerlerde, Nemotod ilaçlamasından 1-2 gün önce (kök gelişimini ve fonksiyonunu artırmak için)

DAMLMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH 1-2 LT
FULLBASS 69 1 LT
+
GÜBRE

veya

ZENİTH 1-1,5 LT
NOABSES 1 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH 150 cc / 100 LT Suya
NOABSES 150-200 cc / 100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7 100 cc / 100 LT Suya



PROBLEM 1

Bu dönemde (Güzlük dikimlerde) kök gelişimi vejetatif gelişime göre çok zayıf olmaktadır. Kök gelişimini hızlandırmak için çiçeklenme başlangıcında damlamlar öncelikle kök boğazından 7-8 cm uzaklaştırılmalıdır.

Daha sonra da SIK gübreleme ile kök gelişimi hızlandırılmalı, aşırı vejetatif gelişim engellenmelidir. Ayrıca çiçek gelişiminin başlığı dönemde kök gelişimini ve fonksiyonu zayıf olur ise hem döllenme yetersiz olur hem de ilk gelişen meyvelerin kalitesi bozuk olur. (Kof meye, renk ve şekil bozukluğu)

DAMLMADAN (1000 m²YE)

DURAN 2,5 - 5 LT
+
NOABSES 1 LT
+
0-30-40 3-4 KG

veya

FULLBASS 69 1 LT
+
DURAN20 2,5 - 5 LT
+
0-30-40 3-4 KG

veya

TRANS-POL 1 KG
+
FULLBASS 69 1-2 KG
+
0-30-40 3-4 KG

PROBLEM 1'de şok, durdurucu, hormon, yanlış ilaç kullanımı v.s. Nedenlerden dolayı çiçek dökümü, çiçek sapında sararma (abzesik asit birikimi) var ise;

DAMLMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH 1-2 LT
+
NOABSES 1 LT
+
20-20-20 3-4 KG

veya

NOABSES 1 LT
+
CALVİN 2-3 LT
+
PROFER 6 (Demir) 100-150 GR

Şok, hormon stresi için

Yanlış ilaç kullanımı, aşırı toprak nemi

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc / 100 LT Suya
+
ZENİTH 100-150 cc / 100 Suya veya
+
PROMAX COMBI 100-150 GR)
veya

NOABSES 200 cc / 100 LT Suya
+
CALVİN 250-300 cc / 100 LT Suya

Yanlış ilaç kullanımı



PROBLEM 2

Bitkide yanal büyümeye fazla, yaprak geniş, çiçek yarılmaya açıyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²)YE

A

TRANS-POL	1 KG
+ FULLBASS 69.....	1 KG
+ 16-8-24.....	5 KG

B

FOLKAR-K	1-2 LT
+ DURAN.....	2,5 LT
+ 16-8-24	3-4 KG

PROLÜM 1-2 LT

2 gün sonra

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K	200-300 cc / 100 LT Suya
+ MAXİFORTE.....	200 GR / 100 LT Suya

PROBLEM 3

Bitkilerde yanal büyümeye zayıf, boyanma fazla aşırı çiçeklenme var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²)YE

APEX	2,5 LT
+ RATOON 15.....	2,5 KG
+ NOABSES	1 LT
+ 0-30-40	2-3 KG

veya

TRANS-POL	1 KG
+ RATOON 15.....	2,5 KG
+ FULLBASS 69	1 KG
+ 0-30-40	2-3 KG



PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

TRANS-POL	150 GR /100 Lt. Suya
+ MAXİFORTE....	150 GR/100 Lt. Suya

TRANS-POL	150 GR /100 Lt. Suya
+ NOABSES.....	200 cc/100 Lt. Suya

PROBLEM 4

Bitkide sararmalar (Demir-Mangan) veya yanlış ilaçlama, ilaç stresi nemetod ve phytium var ise

DAMLAMADAN (1000 m²)YE

Phytium için;	
+ SUPKORCÜ.....	1 LT

Daha sonra

GLUKOMİX Mn-Fe	2 LT
+ NOABSES	1 LT
+ VEJETOL 29-5-10.....	2-3 KG

veya

SULPHUR.....	3 KG
+ NOABSES.....	1-2 KG
+ GLUKOMİX Mn-Fe.....	1-2 LT
+ GÜBRE	

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES	200 cc /100 Lt. Suya
+ GLUKOMİX Mn-Fe	200 cc /100 Lt. Suya

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Güzlük Çeşitler için)

MEYVE DÖNEMİ



PROBLEM 1

Meyve dökülmesi, meyve sapında sararma var ise;

Nedeni: Aşırı toprak nemi, köklerde boğulma

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

CALVIN 2 LT

+

NOABSES 1-2 LT

+

18-18-18 4-6 KG

+

KALSİYUM NİTRAT 3-4 KG

Nedeni: Yanlış ilaçlama veya yaprak gübresi (İzelement yakmaları) kullanımı, durdurucu, hormon veya hormonlu ürün kullanımına çeşitlerin aşırı hassasiyeti v.b. sararma (absesik asit birikimi) var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 2 LT

+

CALVIN 2-5 LT

Nedeni: Ani hava değişimi (Ani Nem düşmesi)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1-2 LT

+

ZENİTH 2 LT

+

GÜBRE

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suya

+

ZENİTH 150 cc/100 LT Suya veya (PROMAX COMBİ 100-150 GR.)

+

FULLY ENERGY 7 150-200 cc/100 LT Suya



PROBLEM 2 A

İlk meyvelerde meyve gelişimi zayıf, homojen gelişim yok,
yaprak ve sürgün gelişimi fazla ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17 5 KG

+

16-8-24 2 KG

veya

MAXİEND 10-7-17 3-5 KG

+

16-8-24 2-3 KG

+

0-0-51 2 KG

PROBLEM 2 A İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ULTRA K30 200 cc/ 100 LT Suya

+

MAXİFORTE 200 GR/100 LT Suya

PROBLEM 2 B

Meyve gelişimi zayıf, aynı zamanda bitki yeşil aksamıda zayıf ise;

DAMLMADAN (1000 m²'YE)

SULPHUR	3 KG
+	
TORK K15	3-5 KG
+	
16-8-24	3-4 KG
+	
APEX.....	.2 LT

veya

TORK 15	3-5 KG
+	
16-8-24	3-4 KG
+	
APEX	2 LT
+	
NOABSES.....	1 LT

PROBLEM 2 B İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE	150-200 GR/100 LT Suya
+	
PROMAX COMBI	150 GR/100 LT Suya
+	
FULL ENERGY 7	150 -200 cc/100 LT Suya

PROBLEM 3

Çatlama var ise. Özellikle yeşil çatlamadanın sebebi kök gelişiminin ve fonksiyonunun zayıf olması ile beraber uzun süre susuz bırakıp, sonra sulamaktır. (Düzenli sulamanın dışına çıkmak) Bu nedenden dolayı yeşil ve kırmızı çatlamalar ve yumuşamalar artar.

DAMLMADAN (1000 m²'YE)

NOABSES	1-2 LT
+	
CALVIN	3-5 LT
+	
GÜBRE	3-5 KG

veya

ZEİNH	2 LT
+	
NOABSES	1-2 LT
+	
16-8-24.....	2-3 KG

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH	150 cc/ 100 LT Suya
+	
NOABSES	200 cc/100 LT Suya



PROBLEM 4

Meyve renklenmesinde gecikme (homojen renklenmemesi), beyaz sinek zararı, kök problemleri var ise;

DAMLMADAN (1000 m²'YE)

MAXİEND 10-7-17	3-5 KG
+	
MAXİFORTE.....	1 LT
+	
GLUKOMİX Mn-Fe	2 LT
+	
6-0-49	3-4 KG

veya

SULPHUR.....	3 KG
+	
MAXİEND 10-7-17.....	5 KG
+	
6-0-49	3-4 KG
+	
GLUKOMİX Mn-Fe	2 LT

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE	200 GR/ 100 LT Suya
+	
GLUKOMİX	200 cc/100 LT Suya

veya

MAXİFORTE	200 GR/ 100 LT Suya
+	

veya

MAXİFORTE	200 GR/ 100 LT Suya
+	
GOLDEN Ka.Te.Se	400-500 cc/100 LT Suya

İri meye tam değilse

Vejetatif kısımda güçlü ise

Vejetatif kısımda güçlü veya tepe alınmış meyve iyi ise

PROBLEM 5

Meyve döneminde Corrugata var ise, Renklenmenin minimum etkilenmesi için

DAMLMADAN (1000 m²'YE)

PROLİUM	2 LT
+	
FOLKAR-K	2 LT

veya

SUPKOR-Cu	1-2 LT
-----------------	--------

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

SUPKOR-Cu	200 cc / 100 LT Suya
+	
FOLKAR-K	2 LT