



ÇİLEK PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

Çıkıştan Çiçeklenme Dönemine Kadar

PROBLEM 1

Sap sayısı az ve/veya sap gelişimi zayıf ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH.....1-1,5 LT
+
NOABSES.....1 LT
+
18-18-18.....3-4 KG

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

GENESIS L26.....200 cc/100 LT Suya
+
ZENİTH.....150 cc/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7.....150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır

PROBLEM 2

Kök gelişiminde problem var ise;

Nedeni: Toprak yapısı, hastalık, aşırı toprak nemi v.b.

Toprak yapısından dolayı kök gelişimi zayıf ise (Aşırı killi, sert v.b.);

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

RATOON 15.....2,5 KG
+
ZENİTH.....2 LT
+
NOABSES.....1 LT

Toprak çok nemli ise;

CALVİN.....2-3 LT
+
18-18-18.....3 KG
+
NOABSES.....1 LT

3-4 gün
sonra

GLUKOMİX Mn-Fe.....1-2 LT
+
18-18-18.....3 KG

Kök Hastalıkları var ise;

SUPKOR-Cu.....1 LT



PROBLEM 3

Çiçeklenmede gecikme(Homojenlik yok)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FULLBASS 69.....1 KG
+
ZENİTH.....2 LT
+
16-8-24.....4-5 KG

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K.....250 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya

PROBLEM 4

Kireçli toprak ve pH'ı yüksek su kullanılıyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

GLUKOMİX Mn-Fe.....2 LT
+
SULPHUR.....3 KG
+
18-18-18.....4-5 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

GLUKOMİX Mn-Fe.....200 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya

Bu karışım hafta arayla 2 kez uygulanmalıdır.





ÇİLEK PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

MEYVE DÖNEMİ

PROBLEM 1

Meyve gelişimi zayıf ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17.....3-4 KG
+
16-8-24.....2-3 KG
+
APEX.....2-2,5 LT
+
ULTRA-K30.....1-2 LT

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Döllenmeden dolayı büyüme zayıf ise;

MAXİFORTE.....200 GR/100 LT Suya
+
GENESİS L26.....200 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2-3 kez uygulanmalıdır.

Beslenme veya havadan dolayı büyüme zayıf ise;

MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya
+
ULTRA-K30.....200 CC



PROBLEM 2

Meyve renginde açılma, homojen renklenme gibi problem var ise;

Aşırı toprak nemi var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

CALVİN.....2-4 LT
+
NOABSES.....1 LT
+
PROFER 6.....150 GR

2-3 gün
sonra

SULPHUR.....3 KG
+
MAXİEND 10-7-17.....5 KG
+
GLUKOMİX Mn-Fe.....2 LT

Kök gelişimi zayıf, beslenme yetersiz ise;

Önce: Kök gelişimini ve fonksiyonunu arttırmak

Sonra: Beslenmesini yapmak

ZENİTH.....2 LT
+
NOABSES.....1 LT
+
APEX.....2 LT

GLUKOMİX Mn-Fe.....2 LT
+
MAXİFORTE.....1 KG
+
16-8-24.....4-5 KG

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Renk homojen değil ise;

MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya
+
GLUKOMİX Mn-Fe.....200 cc/100 LT Suya

Renklenmede gecikme var ise;

MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya
+
ULTRA-K30.....200-250 cc/100 LT Suya

veya

MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya
+
FOLKAR-K.....200 cc/100 LT Suya

Bu uygulamalar 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 3

Meyve sayısı fazla ve vejetatif gelişim zayıf ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

20-20-20..... 4-6 KG
+
FULL ENERGY 7.....1-2 LT
+
NOABSES.....1 LT
+
PROMAX COMBI..... 250-400 GR

veya

VEJETOL 29-5-10 2-3 KG
+
NOABSES.....1-2 LT
+
PROMAX COMBI..... 300-400 GR

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FULL ENERGY 7..... 200 cc/100 LT Suya
+
NİMBUS 52..... 200 GR/100 LT Suya
+
PROMAX COMBI.....150 GR/100 LT Suya

PROBLEM 4

Meyve sapı çok uzun, meyveye dönüşüm gecikiyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17..... 3-5 KG
+
16-8-24..... 2 KG
+
ULTRA K30..... 2 LT

veya

FULLBASS 69..... 1 KG
+
POSFİT K50..... 1 KG
+
16.8.24..... 3-5 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya
+
FOLKAR-K..... 250 cc/100 LT Suya

veya

MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya
+
ULTRA K30..... 200-250 cc/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 5

Köklerde nemden veya tıkanmadan dolayı oluşan çözünmeleri önlemek

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K.....1-2 LT
+
PROLİUM.....1-2 LT

veya

SUPKOR CU.....1-2 LT

