



## KAVUN PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

Fideeden Meyve Dönemine Kadar

### PROBLEM 1

Kök gelişim problemleri var ise;

Nedeni: Kılıçlı, sert v.b. Toprak ise;

**DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>)YE)**

ZENİTH.....	1-1,5 LT
NOABSES.....	+ 1 LT
18-18-18.....	2-3 KG
FULL ENERGY 7.....	+ 1 LT

veya

SULPHUR.....	2-3 KG
NOABSES.....	+ 1 LT
18-18-18.....	2-3 KG



Aşırı nemli toprak ve köklerde boğulma var ise;

KALSİYUM NİTRAT.....	2-3 KG
CALVİN.....	+ 2 LT
NOABSES.....	+ 1 LT
PROFER 6.....	150 GR

2-3 Gün  
sonra,

GLUKOMİX Mn-Fe.....	1-2 LT
FULL ENERGY 7.....	+ 1 LT
18-18-18.....	3-4 KG

### PROBLEM 2

Bitki gövdesi ince ve hızlı boyanma var ise;

**DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>)YE)**

RATOON 15.....	2,5 KG
APEX.....	+ 2 LT
FOLKAR-K.....	+ 2 LT
0-30-40.....	+ 2-3 KG

DURAN.....	2,5 LT
FOLKAR-K.....	+ 2 LT
16-8-24.....	2 KG

DURAN.....	2,5 LT
FULLBASS 69.....	+ 1 KG
16-8-24.....	3 KG

#### PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Çıeksiz dönem;

FOLKAR-K.....200 cc/100 LT Suya

NİMBUS 52.....200-250 GR/100 LT Suya

FULLBASS 69.....200 GR/100 LT Suya

veya

Bu karışımı 6-7 gün arayla 2 kez uygulamalıyız.



### PROBLEM 3

Çiçekli dönemde boyanma var ise(Vejetatif gelişim çok hızlı)

**PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM**

ZENİTH.....	150 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE.....	+ 250 GR/100 LT Suya

FOLKAR-K.....	200-250 cc/100 LT Suya
MAXİFORTE.....	+ 250 GR/100 LT Suya

FULLBASS 69.....200 GR/100 LT Suya

veya



## KAVUN PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

### MEYVE DÖNEMİ

#### PROBLEM 1

**Meyve sararmaları var ise;**

Nedeni: Kök boğulmaları ve/veya kök fonksiyonun da yetersizlik, aşırı toprak nemi ve/veya dengezsizliği  
ani hava değişimleri (Sıcaklık ve nem), yanlış ilaç kullanımı v.b. sebeplerden dolayı kökte ve meyve saplarında  
absesikasit birikimi

**Kök boğulmaları var ise;**

Nedeni: Aşırı sulama veya toprak suyu yüksek ise.

#### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

CALVIN.....	2-4 LT
NOABSES.....	+ 1-1,5 LT
PROFER 6.....	+ 150 GR

2 Gün  
sonra

ZENİTH.....	2 LT
MAXİFORTE.....	+ 1 KG
18-18-18.....	+ 4 KG

veya

ZENİTH.....	2 LT
SULPHUR.....	+ 3 KG
18-18-18.....	+ 4 KG

**Ani hava neminde değişim var ise;**

ZENİTH.....	2 LT
NOABSES.....	+ 1 LT
18-18-18.....	+ 4-5 KG

#### PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

CALVIN.....	250-300 cc/100 LT Suya
NOABSES .....	+ 200 cc/100 LT Suya

Bu karışım aynı zamanda yanlış ilaç kullanımı veya yanlış BGD'li yaprak gübreleri  
kullanımından sonra kullanılabilir.



#### PROBLEM 2

**Meyve büyümelerinde gecikme, homojen büyümeyenin olmaması v.b.**

#### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

MAXİEND 10-7-17 .....	4-5 KG
+	
NOABSES.....	+ 1-1,5 LT
+	
FULL ENERGY 7.....	+ 1 LT
+	
16.8.24.....	+ 3 KG

veya

MAXİEND 10-7-17.....	5 KG
+	
16-8-24 .....	+ 2 KG
+	
ULTRA K30.....	+ 1-2 LT

#### PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE.....	250 GR/100 LT Suya
+	
ULTRA-K30.....	+ 200 CC

Bu ürün 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

## PROBLEM 3

Bitki üzerinde çok sayıda meyve var ve vejetatif gelişim zayıf ise;

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

20-10-20 Veya 20-20-20.....4-6 KG  
+  
FULL ENERGY 7.....1 LT  
+  
NOABSES.....1 LT  
+  
PROMAX COMBI.....200-250 GR

veya

20-10-20.....3 KG  
+  
TORK-K15.....5 KG  
+  
NOABSES.....1 LT  
+  
PROMAX COMBI.....200-250 GR

### PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FULL ENERGY 7.....200 cc/100 LT Suya  
+  
NIMBUS 52.....200 GR/100 LT Suya  
+  
PROMAX PLUS.....100 GR/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

## PROBLEM 4

Meyve çatlama riski var ise;

1 nci Sebep: Ani toprak neminin değişmesi ve/veya aşırı sulama ise;

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

CALVİN.....3-4 LT  
+  
NOABSES.....1-1,5 LT  
+  
18-18-18.....4-5 KG

2 nci Sebep: Ani hava neminin değişmesi ise;

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

ZENİTH.....2 LT  
+  
NOABSES.....1-1,5 LT  
+  
18-18-18.....4-5 KG

### PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

1 nci Sebep:

CALVİN.....250-300 cc/100 LT Suya  
+  
NOABSES.....200 cc/100 LT Suya

2 nci Sebep:

ZENİTH.....150 cc/100 LT Suya  
+  
NOABSES.....200 cc/100 LT Suya

Bu karışımlar 5 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



## PROBLEM 5

Meyve olgunlaşmasında gecikme(Çitirda gecikme)

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

MAXİEND 10-7-17 .....	4-5 KG
+ GOLDEN Ka.Te.Se.....	2 LT
+ 6-0-49.....	2 KG
+ MAXIFORTE.....	1 KG

veya

SULPHUR.....	3 KG
+ ULTRA-K30.....	2 LT
+ MAXİEND 10-7-17.....	4-5 KG

### PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

GOLDEN Ka.Te.Se.....	300-500 cc/100 LT Suya
+ MAXIFORTE.....	200-250 GR/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

## PROBLEM 6

Bakır eksikliğinden kaynaklanan çürüme ve lekeleri önlemek;

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

FOLKAR-K.....	2 LT
+ PROLİUM.....	1-2 LT

veya

SUPKOR CU.....	1 LT
----------------	------

### PROBLEM 6 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K.....	200-250 cc/100 LT Suya
+ PROLİUM.....	150-200 cc/100 LT Suya

veya

SUPKOR CU.....	150-200 cc/100 LT Suya
----------------	------------------------

## PROBLEM 7

### DAMLAMADAN (1000 m<sup>2</sup>YE)

Kılcal köklerin gelişimini hızlandırmak için;

ZENİTH.....	2-2,5 LT
+ NOABSES.....	1-1,5 LT



## KAVUN HASTALIK VE ZARARLILAR İLE MÜCADELE

### Yaprak Hastalıkları İçin;

SupKor-Cu 150 cc/100 lt suya uygulanır. Duruma göre tekrarlanır.

### Kök Hastalıkları ve Uygulamalar

- Fusarium sp.
- Phytophthora sp.
- Phytophthora sp. vs. Damlamadan 1-2 lt/1000m<sup>2</sup> SupKor-Cu uygulanır. Duruma göre tekrarlanır.

### Külemeye - Kırmızı Örümcek İçin;

SULPHUR 150 gr/100 lt suya

### KAVUN YAPRAK ZARARLARI VE UYGULAMALAR

Böcek ilaçlarından önce ilaçlama aletine (pH ayar,yayıcı-yapıştırıcı vs) öne 2000 CO-MUT 100cc/100 lt suya konur.Daha sonra böceklerde kitin sentezini engelleyen 2000 OCTIL 50cc/100 lt suya eklenir.Sonra zehirler eklenerek püskürtme yapılır.