



DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Baharlık Çeşitler İçin)

FİDE DÖNEMİ

PROBLEM 1

Soğuktan ve virüsten dolayı fide gelişiminin yavaşlaması var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

ZENİTH.....1-1,5 LT
+
NOABSES..... 1 LT
+
18-18-18 veya 20-20-20.....3-4 KG

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM (SOĞUK VE VİRÜS)

ZENİTH.....150 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE..... 200 cc/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 2

Hormonal uygulamalar (Şok) yanlış ilaçlama (Özellikle ot ilaçları ve toprak altı ilaçları)

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

CALVİN..... 2-3 LT
+
KALSİYUM NİTRAT..... 2-3 KG
+
NOABSES 1-1,5 LT
+
18-18-18 3-4 KG

Bu karışım tüm dönemler için kullanılabilir.

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES200 cc/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7..... 150 cc/100 LT Suya
+
CALVİN..... 250-300 cc /100 LT Suya

PROBLEM 3

Kök gelişiminde zayıflık (Kılcal saçakta zayıflık)

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

Normal ve ince bitkilerde;

ZENİTH.....1-1,5 LT
+
RATOON 15..... 2,5 KG
+
18-18-18 2-2,5 KG

Normal ve Kalın bitkilerde;

DURAN 2,5 LT
+
NOABSES 1 LT
+
18-18-18 3 KG

PROBLEM 4

Özellikle aşırı nemli (Çamur) toprağa dikim yapılmış ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

Önce

CALVİN..... 2-3 LT

NOABSES..... 1-1,5 LT

18-18-18..... 3-4 KG

2 - 3
gün
sonra

SULPHUR.....3 KG

GLUKOMİX Mn-Fe..... 1-2 LT

18-18-18..... 3-4 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES veya MAXİFORTE 200 cc veya 200 GR/100 LT Suya

ZENİTH.....150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 5

Nemden dolayı kök çürükleri var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SUPKORCU..... 1 LT

veya

FOLKAR-K..... 1-2 LT

İLAÇ

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Baharlık Çeşitler İçin)

ÇİÇEKLENME ve MEYVE DÖNEMİ



PROBLEM 1

Çiçek açımında gecikme, polen yetersizliği var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

TRANS-POL..... 1 KG

NOABSES..... 1 LT

12-36-12..... 3-4 KG

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

TRANS-POL.....150 GR/100 LT Suya

NOABSES..... 150 cc/100 LT Suya

Meyveli dönem ise;

TRANS-POL.....150 GR/100 LT Suya

MAXİFORTE..... 150-200 GR/100 LT Suya



PROBLEM 2

Virüs riski olan ve ilaç yada BGD'den dolayı tepe bozulmaları var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

ZENİTH..... 2 LT
+
NOABSES..... 1 LT
+
20-20-20..... 4-5 KG

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH..... 150 cc/100 LT Suya
+
NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 3

Bitki vejetatif gelişimi zayıf (Gövde ince), kök fonksiyonu zayıf (Gübre alımı), erken meyve göstermiş ise;

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

PROMAX COMBI..... 300 GR
+
RATOON 15..... 2,5 KG
+
NOABSES 1-2 LT
+
18-18-18 veya 20-20-20 3-4 KG

veya

SULPHUR 3 KG
+
VEJETOL 29-5-10..... 2-3 KG
+
PROMAX COMBI 300 GR.

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

PROMAX COMBI.....100 GR/100 LT Suya
+
NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7..... 200 cc /100 LT Suya

veya

NİMBUS 52 200 GR/100 LT Suya
+
NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 4

Yaprakta renk açıklığı (Karbonhidrat birikimi), tepede (Büyüme ucunda morarma) var ise;

Nedeni: Soğuk dönemde protein miktarı düşer ve karbonhidrat birikimi artar.

DAMLAMADAN (1000 m²/YE)

FULL ENERGY 7..... 1 LT
+
NOABSES 1 LT
+
FOLKAR-K 1-2 LT
+
16-8-24 5-6 KG

Tepede morarma var ise;

NOABSES..... 1 LT
+
FOLKAR-K..... 1-2 LT
+
16-8-24 6-7 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya
+
ZENİTH..... 150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 5

Meyve büyümesinde zayıflık var ise (Kış bitiminde)

Yürüme aralarının gübre atılarak

POTASYUM NİTRAT..... 20-25 KG
+
KALSİYUM NİTRAT10-15 KG

Önce hafif sifonla sulanması
Sonra

DAMLAMADAN (1000 m²*YE)

MAXIEND 10-7-17..... 3-5 KG
+
16-8-24..... 3-4 KG
+
GOLDEN Ka.Te.Se 2-2,5 LT

veya

16-8-24..... 3-4 KG
+
POTANIA-NK..... 2 KG
+
APEX..... 2-3 LT

Bu uygulama 2 sulama yapılabilir.
Bu uygulama aynı zamanda olgun meyvede renklenmeyi de hızlandırır.

PROBLEM 5 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXIFORTE..... 200 GR/100 LT Suya
+
ULTRA-K30..... 200 cc/100 LT Suya

POTANIA-NK..... 250 GR/100 LT Suya

PROBLEM 6

Meyve dökülmesi var ise (absesikasit birikimi);

Nedeni : Ani hava değişimleri, nemli havadan kuru havaya geçişler

DAMLAMADAN (1000 m²*YE)

NOABSES..... 1 LT
+
ZENİTH..... 2 LT
+
16-8-24 6 KG



DOMATES HASTALIK VE ZARARLILAR İLE MÜCADELE

Yaprak Hastalıkları ve Uygulamalar

Clavibacter Michiganensis sp(Felç) • Pseudomonas sp (Bakteriyel benek) • Alternaria sp.
• Botrytis sp. • Phytophthora sp. • Pseudomonas Corrugata (Balgam)

Var ise ilaçlamalardan 1-3 gün önceden ve 2-4 gün sonradan SupKor-Cu 200-250 cc/100 lt suya uygulanır.Duruma göre tekrarlanır.

Kök Hastalıkları ve Uygulamalar

• Fusarium sp. • Phytium sp. • Phytophthora sp. • Verticillium sp. • Clavibacter Michiganensis sp.
Damlamadan 1-2 lt/1000m² SupKor-Cu uygulanır. Duruma göre tekrarlanır.

Küllemeye Karşı

SULPHUR 150-300 gr/100 lt suya

DOMATESTE YAPRAK ZARARLILARI VE UYGULAMALAR

Böcek ilaçlarından önce ilaçlama aletine(pH ayarı,yayıcı-yapıştırıcı vs) öne 2000 CO-MUT 100cc/100 lt suya konur.Daha sonra böceklerde kitin sentezini engelleyen 2000 OCTIL 50cc/100 lt suya eklenir.Sonra zehirler eklenerek püskürtme yapılır.