

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Kışlık Çeşitler için)

FİDE DÖNEMİ



PROBLEM 1

Fide bandırma 20 LT suya 70-80 cc SUPKOR-Cu konup fideler bandırılır.

(AŞILI)Aşı yerlerinden kararma ve kahverengileşmesini önlemek için dikim kurallarına uyulmalı, aşı yerleri toprağın üzerinde kalmalıdır. Ayrıca damarları açmak için;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

İLAC +
FOLKAR-K 1-2 LT veya SUPKOR-Cu.....1 LT

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

AŞI YERLERİNE
FOLKAR-K 200 cc/100 LT Suya veya SUPKORCU..... 200-250 cc/100 LT Suya
+
PROLİUM 200-300 cc/100 LT Suya



PROBLEM 2

Bitkide aşırı boylanma var ise; Çeşide ve sera şartlarına bağlı olarak sık gübreleme yapılmalı.

Bitki ince ve hızlı büyüyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FULLBAS 69 1 KG veya APEX 2 LT
+
RATOON 15 2,5 KG veya RATOON 15 2,5 KG
+
0-30-40 2-3 KG veya 0-30-40 2-3 KG

Normal kalın veya hızlı büyüyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

DURAN 2,5 LT veya DURAN 2,5 LT
+
0-30-40 2 KG veya FULLBAS 69 1 KG
+
FOLKAR-K 1 LT veya 0-30-40 2-3 KG
+
APEX 2 LT

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE 150-200 GR/100 LT Suya veya FULLBAS 69.....200-250 GR/100 LT Suya
+
FOLKAR-K 250-300 cc/100 LT Suya 5 GÜN ARAYLA 2 UYGULAMA

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Kışlık Çeşitler için)

ÇİÇEKLENME DÖNEMİ

PROBLEM 1

Şok, Durdurucu, Hormon v.b. Nedenen dolayı çiçek saplarının tam oluşmaması, oluşmaların saplarında sararma ve dökülme olması (absesikasit birikimi). Aynı zamanda kök ve vejetatif kısım döllemeye hazır olmadan çiçeklerin erken açabileceği durumlarda (durdurucu v.b.)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

CALVIN 2-3 LT
+
NOABSES 1-2 LT
+
KALSİYUM NİTRAT 3-4 KG
+
PROFER 6 150-200 GR

2 gün
sonra

ZENİTH 1-2 LT
+
NOABSES 1 LT
+
20-20-20 veya 18-18-18 5 KG
+
APEX 2 LT

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7 100 cc/100 LT Suya
+
ZENITH 150 cc/100 LT Suya



PROBLEM 2

Bitki ince ve hızlı boylanma var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FULLBASS 69 1 KG
+
RATOON 15 2,5 KG
+
0-30-40 2 KG
+
ZENİTH 1-2 LT

veya

FULLBASS 69 1 KG
+
RATOON 15 2,5 KG
+
APEX 2-2,5 LT
+
ZENİTH 1-2 LT

Bitki normal veya biraz kalın gidiyor ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

DURAN 2,5 LT
+
0-30-40 3-4 KG
+
FOLKAR-K 1 LT

DURAN 2,5 LT
+
FULLBASS 69 1-2 KG
+
0-30-40 3-4 KG

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Bitki ince ve hızlı boylanma var ise;

MAXİFORTE 100-150 GR/100 LT Suya
+
TRANS-POL 150 GR/100 LT Suya

veya

MAXİFORTE 150-200 GR/100 LT Suya
+
PROMAX COMBI 100 GR/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7 150-300 cc/100 LT Suya

Bitki normal veya biraz kalın gidiyor ise;

MAXİFORTE 200 GR/100 LT Suya
+
FOLKAR-K 250-300 cc/100 LT Suya

veya

FULLBASS 69 200 -250 GR/100LT Suya
+
FOLKAR-K 250-300 cc/100 LT Suya

PROBLEM 3

Çiçek açmada gecikme, polen azlığı veya gelişim zayıflığı, dölleme problemleri var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

18-18-18 3 KG
+
0-30-40 3-4 KG
+
TRANS-POL 1KG

veya

TRANS-POL 1 KG
+
FULLBASS 69 1-2 KG
+
0-30-40 4 KG

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 150 cc/100 LT Suyu
+
TRANS-POL 150 GR/100 LT Suyu

veya

MAXİFORTE 100-150 GR/100 LT Suyu
+
TRANS-POL 150 GR/100 LT Suyu



PROBLEM 4

Çiçek -Meyve sapında inceleme, aşırı uzama, kırılma veya yamulma (Bıkılma)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1 LT
+
TRANS-POL 1 KG
+
0-30-40 5-6 KG
+
APEX 2-3 LT

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 150-200 cc/100 LT Suyu
+
TRANS-POL 150 GR/100 LT Suyu

veya

FULLBASS 69 200 GR/100 LT Suyu

Bu karışım aynı zamanda polen oluşumunu hızlandıracığı için arı beslenmesini (Çalışmasını) de hızlandırır

PROBLEM 5

(Çiçeklenme ve meyve dönemi için) Soğuk dönemde yaprak ayalarında hafif sararmalar. Nedeni, karbonhidrat birikiminin artması (Soğuk-kuru hava), ilaç stresi, sulama stresi, kök gelişimi ve aktivitesinin zayıflaması (Kök gelişim süresinin uzaması)

1. Uygulama

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1-1,5 LT
+
ZENİTH 2 LT
+
18-18-18 6 KG
+
FULL ENERGY 7 1 LT

2. Uygulama

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SULPHUR 3 KG
+
18-18-18 6 KG
+
MAGNEZYUM SÜLFAT veya MAGNEZYUM NİTRAT 2,5 KG
+
GLUKOMİX Mn-Fe 2 LT

PROBLEM 5 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suyu
+
GLUKOMİX Mn-Fe 250 cc/100 LT Suyu

6-7 gün arayla 2 uygulama

PROBLEM 6

(Çiçeklenme ve meyve dönemi için) Kirpik ucu yanmaları var ise;

Nedeni: Ani nem değişimi, kök gelişim süresinin (Kılcal saçak gelişimi) uzaması, ilaçlamanın aşırı ve yanlış yapılması v.s.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

TRANS-POL 1-2 KG
+
NOABSES 1-2 LT
+
18-18-18 5-6 KG

veya

CANTONE-B 2-3 LT
+
NOABSES 1-1,5 LT
+
18-18-18 6 KG

PROBLEM 6 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suyu
+
TRANS-POL 150 GR/100 LT Suyu

6-7 gün arayla 2 uygulama

DOMATES PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

(Kışlık Çeşitler için)

MEYVE DÖNEMİ

PROBLEM 1

Meyve dökülmesi var ve/veya çatlaması var ise;

Nedeni: Sıcaklık ve nem değişimi (hava ve toprak), yanlış ilaçlama ve gübreleme, nemotod, kök hastalıkları bitkinin yaşlanmasını sağlayan diğer etkenler (meyve sapında absesikasit birikimi)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTHN 2 LT
+
NOABSES 1-2 LT
+
GÜBRE

Bu karışım nemotod var ise ilaçlamadan 2-3 gün önce veya sonra ,hastalık var ise ilaçlamadan 3-4 gün sonra verilmelidir.

Eğer aşırı sulama veya uzun süre susuz bırakıp sonra sulanmış ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1,5-2 LT
+
CALVİN 4-5 LT
+
18-18-18 6 KG
+
PROFER 6 150 GR

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suya
+
ZENİTH 150 cc/100 LT Suya

Sulama ile ilgili problem var ise;

NOABSES 200 cc/100 LT Suya
+
CALVİN 200-300 cc/100 LT Suya



PROBLEM 2

Meyve şekil ve şekil bozuklukları var ise;

Nedeni: Döllenme bozuklukları (Yetersiz polen, döllemsiz meyve), kök yetersizliği, yetersiz beslenme v.s. Döllenme ile ilgili bozukluklar için;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

TRANS-POL 1-1,5 KG
+
16-8-24 6 KG
+
MAXİFORTE 1 KG

veya

TRANS-POL 1-2 KG
+
16-8-24 6 KG
+
FULLBASS 69 1-2 KG

Kök yetersizliğinde;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1,5-2 LT
+
ZENİTH 2 LT
+
16-8-24 6 KG

Kök hastalıkları v.b. ve damar tıkanıklığı var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1,1,5 LT
+
FOLKAR-K 1,5-2 LT
+
16-8-24 6 KG

veya

SUPKOR-Cu 1-2 LT

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Döllenme problemleri var ise;

MAXİFORTE 150 GR/100 LT Suya
+
TRANS-POL 125 GR/100 LT Suya

6-7 gün arayla 2 uygulama

Beslenmeden kaynaklı meyve şekil bozuklukları var ise;

ULTRA K30 2 LT
+
FULLBASS 69 1-2 KG
+
16-8-24 5-6 KG

PROBLEM 3

Meyvede çıtırlaşma var ise;

Nedeni: Ani nem ve sıcaklık değişimi, yanlış ilaçlama, dengesiz sulama ve kök boğulmaları, kılcal köklerin gelişiminde gecikme v.s.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH	1-2 LT
+	
NOABSES	1-1,5 LT
+	
FULL ENERGY 7	1 LT
+	
16-8-24	6 KG

Bu karışım 15 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH	150 cc/100 LT Suya
+	
NOABSES	200 cc/100 LT Suya
+	
FULL ENERGY 7	150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 1 hafta arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 4

Maçadaki (Salkım) meyvelerin ve maçalar arası meyvelerin gelişiminde (Büyümesinde) homojenliğin olmaması.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SULPHUR	3 KG
+	
MAXİEND 10-7-17	5 KG
+	
FULLBASS 69	1 KG
+	
ZENİTH	1-2 LT

veya

MAXİEND 10-7-17	4-5 KG
+	
ZENİTH	1-2 LT
+	
NOABSES	1-1,5 LT
+	
APEX	2,5 LT

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE	200 GR/100 LT Suya
+	
ZENİTH	150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 5

Meyve renklenme problemleri, renklenmede gecikme, homojen renklenmeme

1. Uygulama

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17	4-5 KG
+	
GLUKOMİX Mn-Fe	1-2 LT
+	
6-0-49	2-3 KG

2. Uygulama

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17	4-5 KG
+	
POTANİA-NK	2 KG
+	
6-0-49	3-4 KG

PROBLEM 5 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE	200 GR/100 LT Suya
+	
ULTRA - K30	200 cc/100 LT Suya

veya

POTANİA-NK	250 GR/100 LT Suya
------------------	--------------------

Homojen renklenme için;

MAXİFORTE	200 GR/100 LT Suya
+	
GLUKOMİX Mn-Fe	200-250 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

Hızlı renklenme için;

MAXİFORTE	200 GR/100 LT Suya
+	
GOLDEN Ka.Te.Se	400-1000 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 6

Özellikle beyaz sinek zararından dolayı sarı-kırmızı renk oluşumu

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

SULPHUR	3 LT
+	
GLUKOMİX Mn-Fe	2 LT
+	
FULL ENERGY 7	1-2 LT
+	
16-8-24	6 KG

veya

FOLKAR-K	2 LT
+	
MAXİFORTE	1 KG
+	
ULTRA - K30	1-2 LT

PROBLEM 6 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE	200 GR/100 LT Suya
+	
FOLKAR-K	250-300 cc/100 LT Suya
+	
FULL ENERGY 7	150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 7

Olgun meyvelerin yıldız altlarında çatlamalar varsa;

PROBLEM 7 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Hava ve sulamaların hızlı değiştiği dönemlerde her ilacın içerisine

NOABSES 200 cc/100 LT Suyu
+
CALVİN..... 300 cc / 100 LT Suyu
+
İLAÇ



PROBLEM 8

Çiçek burnu çürüklüğü var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES 1-2 LT
+
CALVİN 2-4 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 8 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suyu
+
CALVİN 300 cc/100 LT Suyu

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 9

Soğuk dönemden bahar dönemine geçişlerde tepe gelişiminde incelleme, durgunluk, aşırı meyve oluşumundan dolayı meyve irimesi v.b.

Yürüme aralarının gübre atılarak(POTASYUM NİTRAT 20-25 KG + KALSİYUM NİTRAT 10-15 KG)

Önce hafif sifonla sulanması

Sonra:

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

18-18-18 veya 20-20-20 6 KG
+
NOABSES 1,5-2 LT
+
ZENİTH 2 LT
+
APEX 2,5 LT

veya

SULPHUR 3 KG
+
NOABSES 1-2 LT
+
VEJETOİL 29-5-10 2 KG

PROBLEM 9 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NİMBUS 52 200-250 GR/100 LT Suyu
+
FULL ENERGY 7 200 cc/100 LT Suyu

veya

NOABSES 150 cc/100 LT Suyu
+
MAXİFORTE 150 GR/100 LT Suyu
+
PROMAX COMBİ 80 GR/100 LT Suyu

PROBLEM 10

Yeşil veya renklenmeye başlamış meyvede gevşeme veya yumuşama problemleri var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

6-0-49 6-7 KG
+
MAXİFORTE 1 LT
+
GRONZİN L7 1-2 LT

5 gün
sonra

KALSİYUM NİTRAT 2-3 KG
+
CALVİN 2-2,5 LT
+
NOABSES 1 LT
+
PROFER 6 150 GR

PROBLEM 10 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE 200 GR/100 LT Suyu
+
CALVİN 250-300 cc/100 LT Suyu

veya

NOABSES 200 cc/100 LT Suyu
+
CALVİN 250-300 cc/100 LT Suyu

PROBLEM 11

Meyve içinde kararma, kabukta kalınlaşma, çekirdekte kararma v.b.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

TRANS-POL 1 KG
+
NOABSES 1-1,5 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 11 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Meyve içi ve/veya çekirdek kararmaları besin eksikliği (Bor), hormonal dengesizlik (Bitkinin hava şartlarına uyumsuzluğu) absesikasit birikimi v.b. var ise;

TRANS-POL 150 GR/100 LT Suya
+
NOABSES veya MAXİFORTE 250 cc-200 GR/100 LT Suya

Meyve kabuğunda kalınlaşma var ise;

Nedeni: Hastalık (Bakteriyel, virütik) veya besin eksikliği. stres

ZENİTH 150 cc/100 LT Suya
+
NOABSES veya MAXİFORTE 200 cc veya 200 GR/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7 200 cc/100 LT Suya



PROBLEM 12

Aşılı domateslerde(Çift aşılarda özellikle) aşı yerlerinde kararma ve kahverengileşme olur.(Çatal) aşı yerlerinin üzerinden toprağa kök atmasından dolayı ana saçaklarda kararma (absesikasit birikimi) var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K 1-3 LT
+
İLAÇ

veya

SUPKOR CU 1 LT

2-3 gün
sonra

NOABSES 1-2 LT
+
GLUKOMİX Mn-Fe 1 LT
+
GRONZİN L7 1-2 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 13

Aşırı fosfor ve organik azot kullanımı (Organik madde),gübresizlik, aşırı sulama, işık yetersizliği nedeni ile gövdesi kalınlaşmış ve/veya yumuşak bitkilerde

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

PROLIUM 1-3 LT
+
PROSFİT-K50 2 LT

veya

SUPKOR CU 1 LT

2-3 gün
sonra

6-0-49 6-6,5 KG
+
GRONZİN L7 1-2 LT
+
GLUKOMİX Mn-Fe 1-2 LT

PROBLEM 13 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K 250-300 cc/100 LT Suya
+
PROLIUM 200-250 cc/100 LT Suya

veya

SUPKOR CU 200-250 GR/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arıyla 2-3 kez uygulanmalıdır.