

BİBER PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

Fide Şaşırtma Döneminden,
Çiçeklenme Dönemine Kadar



PROBLEM 1

Toprak yapısı, aşırı toprak nemi, tuzlanma (Toprak ve su) nedeni ile köklerde boğulma ve gelişeme yeşil aksamda sararma, çökme ve gelişeme problemleri var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

NOABSES..... 1 LT
+
SULPHUR..... 3 KG
+
CALVIN..... 2-2,5 LT
+
PROFER 6..... 100 GR

veya

NOABSES..... 1-1,5 LT
+
KALSİYUM NİTRAT..... 2-4 KG
+
CALVIN..... 2 LT
+
PROFER 6..... 100 GR

2 gün
sonra

ZENITH 1-2 LT
+
20-20-20 3 KG
+
FULL ENERGY 7 1 LT



Not: Tuzlanma devam ediyor ise (Su tuzlu ise) 15-20 günde bir bu uygulama tekrarlanmalıdır.

PROBLEM 2

Bitki gövdesi kalın, yaprak ayası geniş, çiçeklenme az ve boylanıyor ise (Hızlı boylanma)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

DURAN 2,5 LT
+
16-8-24 2-2,5 KG

3-4 gün
sonra

GRONZİN 7 1 LT
+
16-8-24 4 KG
+
ULTRA-K30 2 LT

veya

FULLBASS 69 1 KG
+
RATOON 15 4 KG
+
MAXİFORTE 1 KG

PROBLEM 3

Bitki gövdesi ince, yaprak ayası dar bir şekilde boylanma var ise;

Nedeni: Kök gelişimi yetersiz veya fonksiyonel kök az, toprak nemi veya tuzlanma yüksek, yanlış ilaçlama ve gübreleme v.b.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

RATOON 15..... 2,5 KG
+
NOABSES..... 1 LT
+
FULL ENERGY 7 1 LT
+
ÜRE FOSFAT..... 3-3,5 KG

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K..... 250-300 cc/100 LT Suya
+
NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya
+
FULL ENERGY 7 100 cc/100 LT Suya

Bu karışım 4-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 4

Bitki büyüme uçları durmuş, hareketlenme çok zayıf ve yaprak rengi koyu yeşil renk almış

Nedeni: Amonyak birikimi

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

KALSİYUM NİTRAT.....5-8 KG
+
NOABSES.....1-1,5 LT
+
CALVİN.....1-2 LT

2-3 gün
sonra

ZENİTH..... 2 LT
+
20-20-20..... 4 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES200 cc/100 LT Suya
+
GRONZİN L7 Veya ZENİTH150 cc/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 5

Çiçeklenmede gecikme,polen yetersizliği,Polende morarma(Çiçek morarması) var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K..... 2 LT
+
MAXİFORTE..... 1 KG veya
+
16-8-24..... 5-6 KG

FOLKAR-K..... 2 LT
+
FULLBASS 69.....1-2 KG
+
16-8-24..... 5-6 KG

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya
+
TRANS-POL.....100 GR/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



BİBER PROBLEM ve ÇÖZÜMLERİ

MEYVE DÖNEMİ

PROBLEM 1

Çiçek ve meyve dökümü var ise;

Nedeni: Toprak yapısı ve ani nem değişimi,hava sıcaklıklarında ve hava neminde ani değişimler sebebi ile çiçek saplarında ve köklerde absesikasit birikimi(Çiçek saplarında ve sapın çiçeğe bağlandığı yerde kararma)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH 2 LT
+
NOABSES 1-2 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 1 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES 200 cc/100 LT Suya
+
GRONZİN L7 150 cc/100 LT Suya
+
NİMBUS 52 150 GR/100 LT Suya

Bu karışım hafta arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 2

Meyve şekil bozuklukları ve yamulması var ise;

Nedeni: Kök fonksiyonunda azalma, kılcak saçak gelişiminde gecikme, beslenme yetersizliği (Potasyum)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17.....3-4 KG
+
16-8-24.....2,5-3 KG
+
ULTRA-K30..... 2 LT

MAXİEND 10-7-17..... 3-5 KG
+
16-8-24.....3-4 KG
+
SULPHUR..... 3 KG

PROBLEM 2 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

ZENİTH.....150 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE.....250 GR/100 LT Suya

Bu karışım 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.



PROBLEM 3

Kabya biberlerde renklenmede gecikme, homojen renklenmeme v.s.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİEND 10-7-17..... 4 KG
+
ULTRA K30..... 2 LT
+
6-0-49..... 2-3 KG

5-6 gün
sonra

MAXİEND 10-7-17.....3-5 KG
+
6-0-49..... 3 KG
+
GLUKOMİX Mn-Fe..... 2 LT

veya

POTANİA-NK..... 2 KG
+
MAXİEND 10-7-17..... 3 KG
+
6.0.49.....3-4 KG

PROBLEM 3 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

Bitkilerdeki eksikliklere göre;

ULTRA K30..... 200-300 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya

veya

GKUKOMİX Mn-Fe.....150-200 cc/100 LT Suya
+
MAXİFORTE..... 250 GR/100 LT Suya

Bu karışımlardan biri 6-7 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 4

Çiçek burnu çürüklükleri var veya olma ihtimali var ise;

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

CALVİN..... 2,5-3 LT
+
NOABSES.....1-1,5 LT
+
18-18-18..... 5-6 KG
+
PROFER 6..... 100-150 GR

PROBLEM 4 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

NOABSES..... 200 cc/100 LT Suya
+
CALVİN..... 250 cc/100 LT Suya

Bu karışım 5-6 gün arayla 2 kez uygulanmalıdır.

PROBLEM 5

Siyah malçlama yapılan yerlerde kökler ışıklanmadan dolayı toprak yüzeyine doğru gelişmiştir ve fonksiyonel olarak (Enzim-Hormon düzeni) istenen şekilde değildir. Bunun için köklerin tabana doğru gelişimi sağlanmalıdır.

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

MAXİFORTE.....1 KG
+
NOABSES.....1 LT
+
ZENİTH.....2 LT
+
GÜBRE

veya

FULLBASS 69.....1-2 KG
+
ZENİTH.....2 LT
+
GÜBRE

PROBLEM 6

Kök ve kök boğazı kararmalarında

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K.....2 LT
+
İLAÇ

veya

SUPKOR CU.....1-1,5 LT

Bakteriyel hastalıklarda(P.corrugata)

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

FOLKAR-K.....2 LT
+
PROLİUM.....1-2 LT

veya

SUPKOR CU.....1-1,5 LT
+

PROBLEM 6 İÇİN ÜSTTEN KULLANIM

FOLKAR-K.....250-300 cc/100 LT Suya
+
PROLİUM.....200 cc/100 LT Suya

veya

SUPKOR CU.....200-250 cc / 100 LT Suya

PROBLEM 7

Nemotod problemi var ise;

İlaç kullanılmadan 2-3 gün öncesi veya 2-3 gün sonrası

DAMLAMADAN (1000 m²YE)

ZENİTH.....2 LT
+
NOABSES.....1-1,5 LT
+
GÜBRE



BİBER HASTALIK VE ZARARLILAR İLE MÜCADELE

Külleme-Kırmızı Örümcek - Saman Akarı İçin

SULPHUR 150-200 gr/100 lt suya

BİBER YAPRAK ZARARLILARI VE UYGULAMALAR

Böcek ilaçlarından önce ilaçlama aletine (pH ayarı, yayıcı-yapıştırıcı vs) öne 2000 CO-MUT 100cc/100 lt suya konur.

Daha sonra böceklerde kitin sentezini engelleyen 2000 OCTIL 50cc/100 lt suya eklenir.

Sonra zehirler eklenerek püskürtme yapılır.