

KABYA (KIRMIZI BİBER) YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA-AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEK DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE RENKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.	FULLBASS 69 200-250 GR				
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYE STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC				
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA VE VEJETATİF GELİŞİMİNİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR			
ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye, FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			GENESİS L26 200 CC + ZENİTH 150 CC		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
Ca İHTİYACINI GİDERMEYE, ÇOK SAYIDA MEYVEYİ AYNI ANDA VE HIZLI BÜYÜTMeye, MEYVE AĞIRLIĞINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİ FORTE 250 GR + CALVİN 250-300 GR	
HIZLI VE HOMOJEN RENKLENMESİNE BİTKİDE YENİ GELİŞEN MEYVELERİN DÖKÜLMEDEN HIZLI BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 GR