

KAVUN YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	DÖLLENMEDEN HEMEN SONRA 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDE İKEN 100 LT SUYA	MEYVE NORMAL İRİLİĞİNE GELDİĞİNDE (ÇITIR BAŞLANGICI) 100 LT SUYA
KÖKTEN BESİN AKIŞINI HIZLANDIRMAYI, YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDER. HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 200-300 CC + NİMBUS 52 200-250 GR				
P-Zn İHTİYACINI GİDERMEYE ÇİÇEKLENME VE GELİŞİMİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		ZENİT 150 CC + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 C			
Mn-Fe İHTİYACINI GİDERMEYE VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye DÖLLENMEDEN SONRA MEYVE GELİŞİMİ İÇİN BITKİYİ HAZIRLAMAYA YARDIMCI OLUR.		GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + NİMBUS 52 200 GR			
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.			MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 200-300 GR		
MEYVE SARARMALARINI ÖNLEMeye VE DÖLLENEN İLK MEYVENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİT 150 CC + NOABSES 200 CC		
MEYVENİN HIZLI BÜYÜMESİNE İRİ MEYVE OLMASINA MEYVENİN İÇİNİ DOLDURMASINA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250-300 GR	
SERA ÇEŞİTLERİNDE ÇITIRLAŞMAYI HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GOLDEN Ka.Te.Se 250-500 CC
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.		SupKor Cu 200-250 CC			