

AYÇİÇEK YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM AMACI	KULLANIM ZAMANI	ÇIKIŞTAN 15 GÜN SONRA BAŞLANILABİLİR – 8 YAPRAKLI DÖNEME KADAR 1000 m2	8 YAPRAKLI DÖNEMDE 1000 m2	8 YAPRAKLI DÖNEMDEN SONRA DANE OLUŞMAYA BAŞLADIĞINDA 1000 m2
SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA Mn-Fe EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE TEŞVİK EDER.		GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC + FULVONET 24 200 CC + ZENİTH 150 CC		
P-Zn İHTİYACINI KARŞILAMAYA, İLERİKİ DÖNEMDE TANE SAYISINI ARTTIRMAYA, TABLA ÇAPINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
TANE İÇİNİ DOLDURMAYA TEŞVİK EDER.				MAXİFORTE 200 GR
HASTALIKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.			SupKor Cu 200-250 cc	