

TURŞULUK HIYAR YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	TARLAYA DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 1000 m ²	MEYVE GÖRÜLMEME BAŞLANDIĞINDA 1000 m ²	SICAK STRESİ VAR İSE 1000 m ²	VEJETATİF GELİŞİMİN YAVAŞLADIĞI DÖNEM 1000 m ²
BİTKİ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYI, ÇİÇEKLENMEYİ ARTTIRMAYI, YANAL BÜYÜMEYİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + FULL ENERGY 7 200 CC			
MEYVE SAYISINI VE GELİŞİMİNİ ARTTIRMAYA TEŞVİK EDER.		MAXİFORTE 200-250 GR		
MEYVE KAYIPLARINI ÖNLEMENE, (MEYVE BOĞMA VE SARARTMA) MEYVE DAYANIKLIĞINI ARTTIRMAYA, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE, BİTKİDE SU DÜZENİNİ AYARLAMAYA YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200 GR + CALVİN 200-250 CC	
VEJETATİF GELİŞİMİ HIZLANDIRMAYA TEŞVİK EDER.				NOABSES 200 CC + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC