

## BİBER YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA - AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYİ BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE DÖNEMİ 100 LT SUYA
BOĞUM ARASINI KISALTMAYI YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYİ (SÜRGÜN SAYISINI ARTTIRMAYI) ÇİÇEK SAYISINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAYI TEŞVİK EDER.	FOLKAR-K 200-250 CC + NİMBUS 52 200-250 GR + FULL ENERGY 7 150-200 CC			
ÇİÇEK-POLEN SAYISINI ARTTIRMAYI, ÇİÇEK-MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMİYİ, TEŞVİK EDER.		ZENİTH 150 CC + NOABSES 200 CC		
AZOT (N) DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAYA, MEYVE VE SÜRGÜN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA, MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMENE YARDIMCI OLUR.			NİMBUS 52 200-250 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 cc + FULL ENERGY 7 150-200 CC	
ÇOK SAYIDA MEYVENİN HIZLI VE KALİTELİ BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA MEYVE PARLAKLIĞINI ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİ FORTE 200 - 250 gr + CALVİN veya CANTONE-B 200-300 veya 200 CC
KABYA BİBERLERDE RENKLENMEYİ VE BÜYÜMEYİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + FOLKAR-K 250-300 CC
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMASINI ENGELLEMENE YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200-250 GR		