

## DOLMA BİBER YAPRAK GÜBRELEMESİ

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	DİKİMDEN 6-7 GÜN SONRA 100 LT SUYA	ÇİÇEK ÖNCESİ DÖNEM 100 LT SUYA	ÇİÇEK DÖNEMİNDE 100 LT SUYA	MEYVENİN GELİŞMEYE BAŞLADIĞI DÖNEM 100 LT SUYA	MEYVE RENKLENME DÖNEMİ 100 LT SUYA
FOSFOR İHTİYACINI GİDERMEYE YANAL BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMEYE STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.	VEJETOL 10-42-10 200 GR + NOABSES 200 CC + FULL ENERGY 7 200 CC				
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINI SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200 GR			
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA VEJETATİF GELİŞİMİ DÜZENLEMeye, STRES GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NİMBUS 52 200 GR			
ÇİÇEK-MEYVE OLUŞUMUNA DÖKÜMÜNÜ ENGELLEMeye FOSFOR-ÇİNKO İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.			NOABSES 200 CC + ZENİTH 150 CC		
MEYVE DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 150 CC + NİMBUS 52 200 GR	
ÇOK SAYIDA MEYVEYİ AYNI ANDA VE HIZLI BÜYÜTMeye, KALSİYUM İHTİYACINI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 250 GR + CALVİN 250-300 GR	
HIZLI VE HOMOJEN RENKLENMEYE BİTKİDE YENİ GELİŞEN MEYVELERİN DÖKÜLMEDEN HIZLI BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 250-300 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 GR
MEYVE İRİLİĞİNE VE RENKLENMESİNİ HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				ULTRA K-30 200-250 CC	