

## DOMATES YAPRAK GÜBRELEMESİ (SERA - AÇIK)

KULLANIM ZAMANI KULLANIM AMACI	FİDE DÖNEMİ 100 LT SUYA	ÇİÇEK AÇMADAN ÖNCE SALKIM OLUŞURKEN 100 LT SUYA	MEYVE GÖZÜKMEYE BAŞLADIĞINDA 100 LT SUYA	MEYVE YARI İRİLİĞİNDE 100 LT SUYA	RENKLENME BAŞLANGICINDA 100 LT SUYA
AŞIRI BOYLANMAYI ÖNLEMeye BİTKİYİ KÖKLENMEYE TEŞVİK ETMEYE HASTALIKLARA DİRENÇİ ARTTIRMAYA YARDIMCI OLUR.	FOLKAR-K 200-250 CC + MAXİFORTE 200 GR				
BİTKİNİN BOĞUM ARASINI AÇMAMASINA YARDIMCI OLUR.		FULLBASS 69 200-250 GR			
ÇİÇEK SAYISINI ARTTIRMAYA POLEN OLUŞUMUNA, STRES GİDEREREK ÇİÇEK DÖKÜMÜNÜ ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.		ZENİTH 150 CC + NOABSES 200 CC			
MEYVE GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA MEYVE VE ÇİÇEKLENMENİN AYNI OLDUĞU BİTKİDE GENEL OLARAK BESLENMEYİ DÜZENLEMeye YARDIMCI OLUR.			ZENİTH 150 CC + MAXİFORTE 200 GR		
KALSİYUM EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE, ÇATLAMAYI ÖNLEMeye YARDIMCI OLUR.				NOABSES 200 CC + CALVİN 200-300 CC	
MEYVE İRİLİĞİ (MEYVE İÇİNİ DOLDURMAYA) SOĞUK DÖNEMDE SARARMALARI GİDERMEYE YARDIMCI OLUR.				MAXİFORTE 200 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 cc	
BOR (B) EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE POLEN OLUŞUMUNU SAĞLAMAYA, DÖLLENMİŞ POLENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAYA BİTKİNİN GENEL OLARAK GELİŞİMİNİ (VEJATATİF) HIZLANDIRMAYA YARDIMCI OLUR.				TRANS-POL 150 GR + NOABSES 200 CC	
HOMOJEN VE HIZLI RENKLENDİRMEYE GELİŞMEKTE OLAN MEYVELERİN HIZLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUR.					MAXİFORTE 200 GR + VEJETOL 10-5-40 200 GR + GLUKOMİX Mn-Fe 200 CC